

急性期 病院名:

ID 主治医:

発症日: 入院日:

退院日: 転院先:

【疾患名】 脳梗塞 脳出血 SAH その他

部位: 被殻 視床 皮質下 小脳 脳幹 他

【急性期治療】 【併発症】

- 血栓溶解療法 開頭血腫除去術 高血圧
rt-PA 定位血腫除去術 糖尿病
抗血小板療法 クリッピング 肺炎
抗凝固療法 塞栓術 MRSA
昇圧療法 シャント 尿路感染症
降圧療法 減圧術 外 内
その他:

【継続管理】 抗血栓薬 降圧薬 インスリン

【栄養】 経口 経管 胃/腸瘻 IVH

【バリエーション】:入院日数超過

再発 合併症 待機期間延長 その他

補足:

【予後説明】: 再発 マヒ予後 動作予後

マヒ(-)へ マヒ残存 マヒ不明

歩行可能 歩行不可 歩行不明

補足:

Table with columns: 入院時, 退院時, コース選択. Rows include JCS, GCS, mRS, 障害自立度 (退院時), and 日常生活機能評価 (退院時).

回復期 施設名: ① => ② => ③

ID:

主治医

入院日

退院日

【併発症】 高血圧: ①  ②  ③  糖尿病: ①  ②  ③  肺炎: ①  ②  ③  MRSA: ①  ②  ③  尿路感染症: ①  ②  ③

【継続管理】 抗血栓薬: ①  ②  ③  降圧薬: ①  ②  ③  インスリン: ①  ②  ③

Table with columns: ①, ②, ③. Rows include 入院時/退院時, コース, JCS, mRS, 障害自立度, 日常生活機能評価 (退院時).

Table with columns: 日常生活機能評価 (退院時), 床安静指示, 手を胸元まで, 寝返り, 起坐, 坐位保持, 移乗, 移動, 口腔清潔, 食事摂取, 衣服着脱, 意思伝達, 指示通じる, 危険行動. Rows include ①, ②, ③.

【退院時の方針説明】 ① ② ③

在宅 【 通院 訪問診療】 初診日: 【 通所リハ 訪問リハ 老健 ケアマネ】

病院名: 主治医: 事業所: 担当者: 障害自立度: 要介護度: 認知自立度: FIM(総計):

Table with columns: 日常生活機能評価 (初診時), 床安静指示, 手を胸元まで, 寝返り, 起坐, 坐位保持, 移乗, 移動, 口腔清潔, 食事摂取, 衣服着脱, 意思伝達, 指示通じる, 危険行動. Rows include 0点, 1点, 2点.

障害自立度 Jランク: 何らかの障害を有すが、日常生活自立(外出可能). Aランク: 屋内生活概ね自立も、外出には介助を要す. Bランク: 屋内生活に介助を要し、日中ベッド上生活主体(座位可). Cランク: ベッド上生活(食事・着替・排泄介助).

Table with columns: 急性期:得点, 床上安静の指示, どちらかの手胸元まで, 寝返り, 起き上がり, 座位保持, 移乗, 移動方法, 口腔清潔, 食事摂取, 衣服着脱, 他者への意思伝達, 診療上の指示通じる, 危険行動. Rows include 0点, 1点, 2点.